

## Manejo Fitosanitario del Maíz

**Informe Mensual  
Julio de 2017**

### 1.- Antecedentes


El estado de Zacatecas cuenta con condiciones favorables para la producción de Maíz debido a las condiciones agroclimáticas que se tiene en la mayoría de los municipios propios para este cultivo.

En el Estado de Zacatecas se atendieron 25,224 ha. Con el cultivo de maíz, de estas, 8,800 ha. Fueron atendidas con la acción de trampeo, 8,689 ha. Con la acción de muestreo y asimismo se llevó el control biológico de la plaga en 5,000 ha. y el control químico en 2,735 ha. Los municipios de la entidad que se atendieron son: (Atolinga, Benito Juárez, Calera, Concepción del Oro, Cuahutemoc, Fresnillo, Gral. Enrique Estrada, Gral. Francisco R. Murguía, Jerez, Miguel Auza, Mómox, Morelos, Rio Grande, Sain Alto, Sombrerete, Tepechitlan, Téul de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Trancoso, García de la Cadena, Valparaíso, Villa de Cos, Villanueva y Zacatecas), las plagas que se atendieron en el 2015 fueron: Gusano Cogollero y Plagas Rizófagas.

### 2.- Situación fitosanitaria

Se atendieron directamente a 645 productores con control químico y con control biológico.

La relación beneficio costo es positiva con la siguiente relación: 1 : 307.35



Municipios atendidos en la campaña.

## 3- Acciones fitosanitarias

### Muestreo



**Trampeo:** Para trampeo se hacen uso de las siguientes herramientas, las cuales son las más comunes



**Control Químico:** Para el control de plagas, se hace uso del químico Carbofuran el cual es un insecticida en suspensión que actúa por contacto y por vía sistémica dentro de las plantas. Protege los cultivos ampliamente, ya que abarca la gran mayoría de plagas de mayor importancia económica.

**Control Biológico:** Para el control biológico se hace uso de Trichogramma el cual constituye un grupo de himenópteros parasitoides de huevos de insectos muy utilizado en programas de control biológico de plagas, principalmente contra lepidópteros.

**Control Cultural:** El productor se compromete a mover la tierra antes de la siembra, para que todos los huevecillos e insectos queden expuestos y mueran. También se recomienda al productor que realice esta tarea para que se le pueda autorizar cualquier de las acciones antes mencionadas.

## 4.- Cumplimiento de metas.

### Informe Físico

Estado: Zacatecas

Manejo Fitosanitario de Maíz

Informe Correspondiente al mes de julio 2017

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						% AL AÑO
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES		%	
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
<b>TRAMPEO</b>								
SUPERFICIE TRAMPEADA FÍSICA	HECTÁREAS	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	100.00	100.00
SUPERFICIE TRAMPEADA ACUMULADA	HECTÁREAS	96,000.00	25,600.00	25,600.00	70,400.00	67,480.00	95.85	70.29
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	160	0	0	160	160	100	100
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	2,400	640	640	1,760	1,527	87	64
<b>MUESTREO</b>								
SUPERFICIE MUESTREADA FÍSICA	HECTÁREAS	5,500.00	1,500.00	1,097.00	3,700.00	3,075.50	83.12	55.92
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	5,500.00	1,500.00	1,197.00	3,700.00	3,691.00	99.76	67.11
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	550	150	234	370	598	162	109
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>								
SUPERFICIE CONTROLADA FÍSICA	HECTÁREAS	5,000.00	2,500.00	1,204.00	4,300.00	1,678.00	39.02	33.56
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	500	250	265	430	342	80	68
<b>CAPACITACIÓN</b>								
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	0	0	8	8	100	100
<b>ADMINISTRACIÓN</b>								
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS	NÚMERO	0	0	1	0	3	100	100

Informe Físico del Manejo Fitosanitario de Maíz correspondiente al mes de julio 2017.

Fuente: SICAFI, 2017.